

Link do produktu: <https://weterynaryjny.pl/icb-pharma-dergall-vd-1-l-koncentrat-do-zwalczania-ptaszyńca-pleśniakowca-swierzbowcow-bez-pestycydow-p-3428.html>



ICB Pharma DERGALL VD 1 L Koncentrat do zwalczania ptaszyńca, pleśniakowca, świerzbowców - bez pestycydów

Cena	575,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	2633

Opis produktu

Preparat przeznaczony do zwalczania ptaszyńca i innych stawonogów pasożytniczych w hodowli drobiu:

- PTASZYŃCA (*Dermanyssus gallinae*)
- PLEŚNIAKOWCA (*Alphitobius diaperinus*)
- ŚWIERZBOWCÓW (rodzaj *Cnemidocoptes*)
- ORAZ DO OCHRONY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM MIKROBIOLOGICZNYM.

Może być stosowany w obecności ptaków w trakcie cyklu produkcyjnego.

FIZYCZNY MECHANIZM DZIAŁANIA

DERGALL jest preparatem o działaniu fizycznym, opartym na technologii Ecto Net. Eliminacja stawonogów następuje wskutek ich unieruchomienia. Sieć Ecto Net powoduje ścisłą, fizyczną izolację komórek bakteryjnych co chroni hodowlę przed zasiedlaniem, kolonizacją i rozwojem chorób infekcyjnych.

Poprawa dobrostanu ptaków poprzez redukcję stresu związanego z infestacją ektopasożytami:

- wzrost nieśności (do 28%)
- zahamowanie przenoszenia chorób wśród ptaków (toksoplazmoza, salmonelloza, rzekomy pomór drobiu)
- zmniejszenie upaków i poprawa kondycji ptaków (do 27%)*
- spadek ryzyka zachorowań na choroby odzwierzęce (zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego) i alergię wśród pracowników hodowli
- może być stosowany w obecności ptaków
- obniża ryzyko zakażenia bakteryjnego
- nie wnika do tkanek ptaków i składanych jaj
- nie stanowi zagrożenia dla środowiska
- nie zawiera substancji aktywnych
- nie generuje odporności u zwalczanych stawonogów

Wysoka skuteczność preparatu DERGALL w zwalczaniu populacji ptaszyńca (*D. gallinae*) została stwierdzona na podstawie licznych testów terenowych. Śmiertelność *D. gallinae* zasiedlających hodowlę klatkowe osiąga 79,5% po 24 godzinach i aż 92% do 30 dni po przeprowadzeniu zabiegu.

Preparat stosować w stężeniu 1% tj.: 10ml koncentratu na 1 litr wody.

KĄT ROZPROSZENIA:
80°-110° (ciśnienie 0,3 MPa)

ZALECANY ROZMIAR KROPLI:
80 -120 µm.

WYDAJNOŚĆ PREPARATU:
100 ml koncentratu: 100-130 m²

ZASTOSOWANIE PREPARATU DERGALL

ZWALCZANIE PTASZYŃCA

W celu uzyskania wymaganego stężenia roztworu roboczego należy wypełnić wodą opryskiwacz, następnie wlać odmierzoną ilość koncentratu DERGALL i wymieszać. Przygotowany roztwór należy wykorzystać w ciągu 12h od sporządzenia. Preparat DERGALL należy stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub mechanicznych. Zabieg należy wykonać w nocy ok. 60 min. po wyłączeniu światła w hodowli i wyciszeniu się ptaków. Podczas prac należy używać słabego źródła światła np. latarki czołowej lub światła czerwonego.

I ETAP ma na celu zwalczanie aktywnych stadiów rozwojowych ptaszyńców, które poruszają się w celu poszukiwania żywicieli, pobierają krew ptaków lub poszukują kryjówek po zerowaniu.

II ETAP Wykonać opryskiwanie po upływie 4 do 7 dni od pierwszej aplikacji – zależnie od temperatury. Zabieg ma na celu eliminację nowego pokolenia ptaszyńców, które uniknęło kontaktu z preparatem w I etapie. W przypadku uporczywej, intensywnej inwazji zabiegi zwalczające należy powtarzać 1 raz w miesiącu.

CHÓW KLATKOWY Preparat należy nanosić w obecności ptaków na miejsca gromadzenia się ptaszyńca, np.: elementy konstrukcyjne hodowli, powierzchnie karmników, pasy transmisyjne oraz wszelkie szczeliny i zakamarki.

CHÓW ŚCIÓŁKOWY Preparat należy nanosić w obecności ptaków, w miejscach gdzie zwykle gromadzi się ptaszyniec tj.: elementy konstrukcyjne hali hodowlanej, budki lęgowe, gniazda ptaków, ściółkę (wyłącznie w obecności ptaków) oraz wszelkie szczeliny i zakamarki.

ZWALCZANIE PLEŚNIAKOWCA:

Preparat DERGALL w stęż. 1% wykazuje szybką i wysoką skuteczność wobec postaci dorosłych i larw pleśniakowca już po jednorazowym, bezpośrednim opryskaniu. Zabiegi można stosować w obecności ptaków na dowolnym etapie cyklu produkcyjnego. Należy dokładnie opryskać wyłącznie widoczne kolonie owadów. Opryskiwanie ponawiać po pojawieniu się nowego pokolenia owadów.

ZWALCZANIE ŚWIERZBOWCÓW:

Należy rozmiękczyć zmiany skórne na kończynach ptaków. W tym celu należy moczyć stopy i skok do granicy piór w podgrzanym roztworze szarego mydła potasowego przez 4-5 minut. Przy pomocy szczotki usunąć z powierzchni nóg odstające fragmenty chorej tkanki.

W celu fizycznej eliminacji świerzbowca należy nanieść 1% roztwór preparatu DERGALL na kończyny tylne ptaków. Jednocześnie należy opryskać wszystkie miejsca, z którymi stykały się chore zwierzęta i gdzie mogą znajdować się świerzbowce. Zabieg należy powtarzać trzykrotnie co siedem dni.